

## ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 2016

### RIZOCTONIA

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Plazo de seguridad (Días)	Aplicación
Flutolanil 50% (WP)	Moncut 50 WP	NP	Las semillas tratadas deberán llevar rotulado o en una etiqueta, "semilla tratada con flutolanil, inhabilitada para el consumo, destinarla exclusivamente para siembra".
Flutolanil 45,6% (SC)	Moncut SC	NP	Pulverización normal con tractor del tubérculo antes de la siembra y del surco en una sola aplicación por campaña.
Metil tolclofos 10% (DS) Polvo para tratamiento en seco	Rizolex 10-D	80	Aplicar por mezcla en seco, proporcionando un recubrimiento homogéneo. Las semillas tratadas deberán llevar rotulado o en una etiqueta: "semilla tratada con metiltolclofos, inhabilitada para el consumo, destinarla exclusivamente para siembra".
Metil tolclofos 20% + Tiram 30% (WP)	Sumigreen-T	90	Aplicar en pulverización normal al suelo con suficiente cantidad de caldo para que el recubrimiento del suelo sea uniforme. En caso de aplicación localizada reducir la dosis proporcionalmente a la anchura del surco.
Metil tolclofos 50% (WP)	Rizolex, Rizolex 50 WP	NP	Tratar los tubérculos en el momento de la siembra.
Pencicuron 25% (SC)	Trotis 25 SC	NP	Aplicar pulverizando directamente al surco de plantación en el momento de la siembra o pulverizando directamente sobre los tubérculos

La anotación NP significa que en las condiciones autorizadas para el uso de la materia activa el plazo de seguridad no procede. Productos señalados con distinto color pertenecen a distinto grupo químico.