

ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2019

PULGONES

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Plazo de seguridad (días)
Azadiractin 2,6% (como azadiractin A) (EC)	Azatin, Align, Fortune Aza, Oidos, Zenith, Zar, Azar, Azafit	3
Azadiractin 1% (como azadiractin A) (EC)	Adina, Zafiro	3
Alfa cipermetrin 10% (EC)	Dominex 10, Fastac, Avanguard (2)	21
Cipermetrin 10% (EC)	Cyperplan 10 EC, Kontar, Selene, CeKumetrin 10 EC, Sherpa 100 EC, Ralbi-10, Cartec, Citron (3)	14
	Nurelle 10, Cipert 10 LE, Cythrin 100 EC, Cibelte 10 LE, Upala 10, Telxiope 100, Poly-10 (4)	3
Cipermetrin 10% (EW)	Sherpa 100EW (5)	14
Cipermetrin 2 %+ metil clorpirifos 20% (EC)	Daskor	21
Cipermetrin 4 %+ metil clorpirifos 40% (EC)	Daskor 440 (6)	21
Cipermetrin 20% (WP)	Cypermor 20 PM	3
Cipermetrin 50% (EC)	Cythrin Max	3
Deltametrin 10% (EC)	Decis Expert, Decis EC 100	7
Deltametrin 1,57% (SC)	Meteor	7
Deltametrin 2,5% (EC)	Super delta, Deltaplan, Audace, Ritmus, Delta EC, Decis, Itaka, Scatto, Deltagri, Delmur, Rafaga (7)	7
Deltametrin 2,5% (EW)	Decis Evo (8)	7
Esfenvalerato 2,5 % (EC)	Sumipower 2,5 EC, Sfenvalo Star, Sumicidin supra	15
Esfenvalerato 5 % (EC)	Asana	15
Esfenvalerato 5 % (EW)	Sumifive Plus, Sumicidin Extra 5 EW	15
Lambda cihalotrin 1,5% (CS)	Karate Zeon +1,5 CS (9)	3
Lambda cihalotrin 2,5% (WG)	Patrol, Ascot, Estrella 2,5 WG (10)	14
	Lamdex Extra, Lamdex 2,5 WG, Lamdex Extra N (11)	15
Lambda cihalotrin 5% (EG)	Kaiso Sorbie (12)	3
	Kaimo (13)	20
Lambda cihalotrin 10% (CS)	Karate Tecnología Zeon 10 CS, Karate Zeon (14)	3
	Pointer 100 CS, Arsione, Atrapa, Aikido	14
	Karis 10 CS	7
Lambda cihalotrin 10% (EC)	Komodo 10 EC	15
Tau-fluvalinato 24% (SC)	Klartan 24 AF, Klartan 24 AF-N, Mavrik-10 (15)	7
Zeta-cipermetrin 10 % (EW)	Fury 100 EW, Fury	7
Acetamiprid 20% (SG)	Epik 20 SG, Gazel Plus SG	7
Acetamiprid 20% (SP)	Mospilan, Epik	3

MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Plazo de seguridad (días)
Tiacloprid 18 % (OD)	Calypso 180 O-TEQ, Calypso O-TEQ (16)	14
Tiacloprid 48 % (SC)	Calypso, Cumden, Calypso SC (17)	21
Pimetrozina 50% (WG)	Plenum (20)	7

Productos señalados con distinto color pertenecen a diferente grupo químico.

- (1) Acción frenante de ácaros.
- (2) Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 800 l/Ha.
- (3) Induce a la proliferación de ácaros, por lo que se recomienda vigilar los cultivos o plantaciones en que sean frecuente los ataques de los mismos por si fuera necesario aplicar un acaricida específico.
- (4) Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha.
- (5) Dos aplicaciones por campaña con intervalo de 21 días, en pulverización normal con un volumen de caldo de 400-700 l/ha.
- (6) Realizar 1 tratamiento/campaña, a una dosis máxima de 1 l/ha. Volumen de caldo de 200-1.000 l/ha. Para evitar la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni ningún otro que contenga cipermetrín más de una aplicación por año, por especie de insecto y por parcela alternando con sustancias activas con distinto modo de acción.
- (7) Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.
- (8) Controla *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae* y *Aphis nasurtii*. Intervenir a la aparición del parásito. Volumen de caldo de 600-1000 L/ha. Máximo 3 aplicaciones con un intervalo de 14 días.
- (9) Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar 0,9 l/Ha. de producto por aplicación.
- (10) Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre aplicaciones de 15 días.
- (11) Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,56 kg/Ha.
- (12) En hojas no enrolladas. Dosis máxima: 0,3 kg/ha. Dos aplicaciones por campaña con un intervalo de 10-14 días en aplicación normal con tractor ó manual.
- (13) Máximo de 2 aplicaciones separadas al menos 14 días, en pulverización normal con un volumen de caldo de 300 - 1000 l/ha, desde la aparición de los primeros botones florales hasta que el 50% de las bayas han alcanzado su tamaño definitivo
- (14) Efectuar un máximo de 2 tratamientos por campaña con un intervalo mínimo de 15 días sin superar los 140 ml/Ha. de producto por aplicación.
- (15) Acción complementaria contra ácaros tetránquidos
- (16) Tratar sólo mediante tractor con un volumen de caldo de 300-800 l/Ha
- (17) Efectuar como máximo 3 aplicaciones espaciadas 14-21 días.
- (18) Efectuar 1-4 tratamientos espaciados 7-14 días.
- (19) Se puede aplicar mediante riego localizado a 3-4 l/ha.
- (20) Aplicar al inicio de la infestación, efectuando un máximo de 2 tratamientos por campaña.